



شماره
تایمیخ
دارو

جمهوری اسلامی ایران

دارد

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

موضوع: راهنمای بالینی زایمان طبیعی، پس از سزارین VBAC

سلام

احتراماً در راستای استاندارد سازی خدمات و علوم مبتنی بر شواهد به پیوست راهنمای بالینی زایمان طبیعی پس از سازارین تهیه شده در اداره سلامت مادران دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و کمیته کشوری ارتقای سلامت مادران حضورتان ارسال می‌گردد. از آنجا که درخواست مادر برای انجام زایمان طبیعی پس از سازارین از مهمترین موارد است و می‌باشد آگاهی در این خصوص از دوران پیش از بارداری و حین بارداری انجام شود، خواهشمند است دستور فرمائید راهنمای فوق به مراکز جامع سلامت، پایگاههای سلامت، مراکز ارائه دهندۀ خدمت به مادران باردار، تفاهی بیمارستان های دولتی و غیر دولتی تحت پوشش آن دانشگاه (خصوصی، وابسته به ارگانها، خوبیه و...) ابلاغ گردد.

شماره تلفن: ۸۱۴۰۴۹۱۹ - اداره سلامت مادران، پاسخگوی سوالات می‌باشد.

دکتر محمد اسماعیل مطلق
مدیر کل دفتر سلامت جماعت، خانواده و مدارس

کارآزمایی لیبر پس از سزارین با هدف انجام زایمان طبیعی

TOLAC: Trial of Labor after Cesarean Delivery

VBAC: Vaginal Birth after Cesarean Delivery

ما مادر باردار:

هر تین زمان مشاوره، اولین ویژت های پره ناتال و حتی قبل از اقدام به بارداری است. رخصوص مزايا و عوارض سزارين و زایمان طبیعی پس از سزارين به مادر توضیح داده شود و در پرونده بیت گردد.

مادران تا قبل از زایمان می توانند تصمیم خود را در رخصوص انجام زایمان طبیعی یا سزارین تغییر دهند. رای خانواده هایی که تمایل به داشتن فرزند بیشتری دارند VBAC روش مناسب تری برای زایمان است. نانس موفقیت VBAC در بارداری سفالیک، ۲۷ هفته و بالاتر و یک بار سزارین قبلی ۷۵-۷۲ درصد است. در مادران با سابقه دو بار سزارین یا بیشتر VBAC معنی ندارد می بایست با مادر در رخصوص احتمال پارگی حم مشاوره شود.

در صورت تمایل مادر به بستن لوله های رحمی و دارا بودن مجوز آن و ترس مادر از درد لیبر انجام سزارین رجح است.

لیبر VBAC پیش آگهی بهتری دارد:

ایمان واژینال موفق قبلی

مایل مادر به برگشت سریعتر به فعالیت روزمره پس از زایمان

نمایل والدین به تجربه لیبر و زایمان طبیعی

دام به انجام زایمان طبیعی :

گویی دقیق برای انجام زایمان طبیعی موفق پس از سزارین وجود ندارد. آزمایشی برای تشخیص احتمال پارگی اسکار وجود ندارد.

نمایل آگاهی از نوع برش رحمی مانعی برای انجام زایمان طبیعی پس از سزارین نیست و شانس پارگی رحم همانند برش مان تحتانی است.

: انجام زایمان طبیعی حتماً می بایست به درخواست مادر باشد و این درخواست در پرونده ثبت شود. هیچ مادری نباید مجبور به انجام کارآزمایی لیبر شود.

۲. رضایت همسر در خصوص روش زایمان اخذ شود.
۳. در صورت مرگ چنین داخل رحمی بهتر است کارآزمایی لیبر پس از سزارین انجام شود.
۴. اندیکاسیون طبی مامایی برای انجام سزارین نداشته باشد مانند: جفت سرراهی، برعیج FOOTLING وغیره
۵. زایمان می بایست در مراکزی با امکان دسترسی فوری به منابع و پرسنل درمانی (شامل متخصصین بیهوشی، پرسنل اتاق عمل، جراح متخصص زنان مجرب جهت مانیتورینگ زایمان و انجام سزارین اورژانس، پرسنل و امکانات احیاء نوزاد) انجام شود.

اداره زایمان در VBAC:

- ✓ به طور کلی کنترل لیبر و زایمان مشابه زایمان در زنان با رحم بدون اسکار است.
- ✓ مراقبت از مادر می بایست یک به یک باشد.
- ✓ حتماً از مادر رگ باز گرفته شود آزمایش‌های CBC Diff و BG RH و رزرو خون انجام شود.
- ✓ از مانیتورینگ الکترونیک دائم برای کنترل ضربان قلب چنین و کنترل انقباضات رحم استفاده شود. می توان اداره زایمان را با مانیتورینگ الکترونیک یا دستی مطابق مراقبت در مادران پرخطر انجام داد. نحوه استفاده از مانیتورینگ الکترونیک دائم همانند راهنمای بالینی مادران پرخطر است.
- ✓ به علائم و نشانه‌های مادر مانند: تهوع، دردشکم و ... توجه شود.
- ✓ پیشرفت زایمان حتماً در پارتوقراف ثبت شود. پیشرفت زایمان در TOLAC بدون سابقه زایمان واژینال مشابه خانم نولی پار و در افراد با سابقه زایمان واژینال مشابه زنان مولتی پار می باشد. طول مدت عدم پیشرفت در فاز نعال زایمانی نباید حداقل بیشتر از ۲ ساعت باشد.
- ✓ استفاده از روشهای بی درد مانند آپی دورال در هین زایمان منع ندارد

الف) Induction و تحریک زایمان:

توجه: استفاده از پروستاکلندین ها برای القای زایمان غیر مجاز است.

شانس VBAC با اینداکشن کمتر از وقتی است که لیبر خود به خود شروع شده باشد.

روش های مکانیکی: مجاز است. در صورت سرویکس دیلاته و مطلوب آمنیوتومی جهت اینداکشن پیشنهاد می شود.

دیلاتورهای مکانیکی یا کاتترهای ترانس سرویکال یا استفاده از سوند فولی می تواند یک انتخاب مناسب برای افراد خواهان

TOLAC با سرویکس نامطلوب باشد.

اکسی توسین: مجاز است. احتمال بروز پارگی با افزایش دوز اکسی توسین افزایش می یابد حداقل دوز مجاز 20 mU/min

است. در صورت استفاده از اکسی توسین می بایست برای اداره زایمان مانند مادران پرخطر از مانیتورینگ الکترونیک دائم استفاده

شود.

مراقبت پس از زایمان:

بررسی محل برش قبلی به صورت روتین با معاینه دستی بعد از VBAC توصیه نمی شود. در صورت خونریزی واژینال شدید و بروز علائم هیپوولمی معاینه دستی محل اسکار رحمی و بررسی پارگی سرویکس ضروری است.

۶ ساعت پس از زایمان هموگلوبین مادر اندازه گیری شود. در صورت کاهش هموگلوبین از نظر خونریزی بررسی شود.

تا ۶ ساعت پس از زایمان حجم ادرار اندازه گیری شود.

ادامه مراقبتها همانند مراقبت در مادران با زایمان طبیعی می باشد.

تشخیص پارگی رحم:

۱. CTG غیر طبیعی، بروز برادیکاردی جنینی، افت دیررس (مهم ترین و شایع ترین علامت پارگی رحم)، تبدیل شدن گروه

بنده الکتری قلب جنین به گروه II و III

۲. ضعیف شدن و توقف انقباضات رحمی

۳. خونریزی مخفی یا علائم هیپوولمی

۴. خونریزی واژینال غیر طبیعی (ممکن است همیشه اتفاق نیافتد)

۵. تاکیکاردی مادر، افت فشار خون، غش کردن یا شوک

۶. بالا رفتن station جنین

۷. درد شدید ناگهانی شکم و درد بین انقباضات

۸. هماچوری در صورتیکه پارگی رحم به مثانه کشیده شود.

۹. پس از زایمان درد شکمی همراه با خونریزی مداوم علی رغم استفاده از بوتروتونیکها می بایست احتمال پارگی رحم را در نظر گرفت.

مدیریت پارگی رحم:

در صورت احتمال پارگی رحم حین لیبر و unstable بودن مادر از نظر همو دینامیک، حتماً مایع درمانی و تزریق خون انجام شود. مادر سریعاً برای سازارین آماده شود بستگی به حال عمومی مادر، برای انتخاب نوع بیهوشی توسط متخصص بیهوشی تصمیم گیری شود. چنانچه خروج جنین مدد نظر است و حال عمومی مادر مناسب نیست بیهوشی جنرال ارجح است در اینصورت برای کاهش مدت زمان برای خروج، جنین بیهوشی اپیدورال یا اسپاینال کنترل اندیکه است.

تصمیم به هیستر کتومی یا ترمیم رحم به موارد زیر بستگی دارد:

۱. نجات جان مادر

۲. کنترل خونریزی

۳. وضعیت باروری و تمايل مادر به بارداری بعدی

۴. تشخیص آسیب به ارکانهای مجاور مادر مثانه

۵. عارضه کمتر بعد از جراحی

۶. کمترین عارضه در بارداری بعدی

توجه: چنانچه خونریزی مادر قابل کنترل نیست حتما هیسترکتومی انجام شود.

TOLAC در موارد IUFD یا زایمان ترمیمی دوم:

زایمان در ترمیمی دوم؛ در موارد القاء زایمان در ترمیمی دوم با پروستاکلاندین از جمله میزوپروستول نتایج مشابه زنان بدون

اسکار رحمی قبلی است. لذا دیلاتاسیون و تخلیه و القاء زایمان با میزوپروستول روش مناسبی است.

زایمان در ترمیمی سوم در موارد IUFD: آماده سازی سرویکس با یک کانتر فولی ترانس سرویکال پیشنهاد می شود.

زنان در این موارد باید به TOLAC تشویق شود زیرا خطر عوارض جنینی منتفی است و حتی در موارد با ریسک بالاتر از نظر

عوارض اسکار سازارین قبلی (مانند اسکار کلاسیک قبلی) نیز TOLAC می تواند مد نظر قرار گیرد.

مزایا و معایب:

زایمان طبیعی پس از سازارین	انجام سازارین تکراری
پارگی رحم یک مورد در ۲۰۰	پارگی رحم یک مورد در ۴۰۰
پارگی رحم در مادران با دو بار سازارین قبلی دو برابر است.	مرگ یا آسیب جدی عصبی نوزاد یک در هر ۱۰۰
میزان سپسیس نئوناتال بالاتر است.	
کوریو آمنیونیت اینترا پارتوم بیشتر است	بروز عفونتهای لکنی پس از زایمان بیشتر است
مورتالیتی پره ناتال ۰،۱۳ و نوزادی ۰،۱۱	مورتالیتی پره ناتال ۰،۰۵ و نوزادی ۰،۰۶
با این حال میزان خطر کلی بسیار پایین است.	با این حال میزان خطر کلی بسیار پایین است.
تاکی پنه گذاری نوزادی ۳،۶ درصد است	تاکی پنه گذاری نوزادی ۰،۲ درصد است
مدت بستری و عوارض بعد از زایمان در TOLAC کمتر است و بازگشت به فعالیت های روزمره سریع تر است.	مدت بستری و عوارض بعد از زایمان در TOLAC کمتر است و بازگشت به فعالیت های روزمره سریع تر است.
غیر قابل زمان بندی و برنامه ریزی است.	قابل زمان بندی و برنامه ریزی است.
خطر مرگ و میر مادری ۳۸ در صد هزار تولد زنده است	خطر مرگ و میر مادری ۱۳،۴ در صد هزار تولد زنده است
تروما به پرینه بیشتر است.	ترومای تولد به علت چاقوی چراحتی بیشتر است.
موربیدیتی مادری در صورت شکست TOLAC افزایش می یابد	
هیسترکتومی ۰/۱۷ درصد	هیسترکتومی ۰/۰ درصد
انتقال خون ۰/۱۲ درصد	انتقال خون ۰/۹ درصد
نمراه آپکار دقیقه ۵ و میزان بستری در NICU در نوزاد در دو گروه یکسان است.	خطر بروز ترومیوز وربیدی و آمبولی در هر دو به نظر یکسان است.

عواملی که منجر به کاهش شانس موفقیت در انجام زایمان طبیعی می شود.	عواملی که منجر به افزایش شانس موفقیت در انجام زایمان طبیعی می شود.
<ul style="list-style-type: none"> اسکارهای پرخطر رحمی: شامل اسکار کلاسیک، اسکار T/J SHAPE ، انسیزونهای ترانس فوندال یا میومکتومی با گسترش به داخل میومتر سابقه پارگی رحم قبلی سابقه DEHISENCE اسکار رحمی قبلی بیش از یک بار سزارین با برش عرضی شانس پارگی بالاتر است (۹٪-۷۰٪). 	<p>زنان با تنها یک برش سزارین قبلی عرضی در سکمان تحتانی رحم (Low transverse incision) بدون هیچ گونه اسکار رحمی دیگر یا سابقه پارگی رحم و لکن مناسب از نظر بالینی خطر پارگی در موارد مalfورماسیون رحمی با برش سزارین قبلی افزایش نمی یابد</p>
سابقه زایمان واژینال موفق قبل یا بعد از سزارین (بهترین فاکتور پیش بینی موفقیت)	
	بروز لیر خودبه خودی در زمان بستری و Bishop score بالا
فاکتورهای دموگرافیک مادری: افزایش سن (> 35 سال)، کوتاهی قد، چاقی مادر ($BMI > 30$)، نداشتن همسر، سطح سواد پایین (< 12 سال) و نژاد غیرهیسپانیک	
کمتر از ۶ ماه شانس پارگی رحم و موربیدیتی مادری افزایش می یابد	فاصله بین بارداری ها بیش از ۶ ماه (فاصله آخرین زایمان و ابتدای بارداری)
	عدم وجود بیماری های زمینه ای مادری از جمله پره اکلامپسی، فشار خون، دیابت، آسم، بیماری قلبی و کلیوی
بعد از ۴۰ هفته کاهش شانس VBAC و افزایش خطر پارگی رحم وجود دارد. سن بارداری بالای ۴۰ هفته به تنهایی مانعی برای انجام زایمان طبیعی پس از سزارین نیست.	سن حاملگی کمتر از ۴۰ هفته
	شانس موفقیت VBAC و شانس بروز پارگی در دوقلویی مانند TOLAC برای تک قلویی است. امکان TOLAC برای زنان با دوقلویی و یک برش عرضی قبلی رحمی که از سایر جهات کاندید زایمان دوقلویی واژینال هستند وجود دارد.

REFERENCES:

1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Clinical management guidelines for obstetricians-gynecologists, 2010
2. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Updates Recommendations on Vaginal Birth After Previous Cesarean Delivery, 2011
3. Williams Obstetrics 2010, 23th edition, Chapter 26. Prior Cesarean Delivery
4. UpToDate 2016, Choosing the route of delivery after cesarean birth.
5. National Institutes of Health. NIH Consensus Development Conference: vaginal birth after cesarean: new insights. Consensus Development Conference statement. Bethesda (MD): NIH; 2010.
6. Sertilhes L, Vayssi  re C, Beucher G, et al. Delivery for women with a previous cesarean: guidelines for clinical practice from the French College of Gynecologists and Obstetricians (CNGOF). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 170:25.
7. Cochrane Database Syst Rev. Jozwiak M, Dodd JM. Methods of term labour induction for women with a previous caesarean section. 2013 Mar 28;3
8. Cahill AG, Waterman BM, Stamilio DM, et al. Higher maximum doses of oxytocin are associated with an unacceptably high risk for uterine rupture in patients attempting vaginal birth after cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 2008; 199:32.e1.
9. Erez O, Dulder D, Novack L, et al: Trial of labor and vaginal birth after cesarean section in patients with uterine M  llerian anomalies: A population-based study. Am J Obstet Gynecol 196:537.e1, 2007
10. Royal College Of Obstetricians & Gynecology.Birth After Previous Cesarean. Green-top Guideline No. 45.October 2015